



TOPICIDA ESCA IN MINIPellet

Code: 1331152

PRODOTTO BIOCIDA (PT14) AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE IT/2017/00436/AUT in bustina monodose

COMPOSITION

☒(per 100 g): Brodifacoum 0,0025 g, Denatonio Benzoato 0,001 g, Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g.

FORMULATION

Pellet

PACKS

Busta da 140 g in sacchetti predosati da 20 g

Charateristics

Esca rodenticida pronta all'uso in forma di pellet in sacchetti predosati, da utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione e debitamente marcati, in modo che resti protetta dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente. È a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*) e Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in un pellet appetibile per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori. Contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini. Può essere usato all'interno ed intorno agli edifici quali, ad esempio, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di proprietà.



Florlis®

How to use

Uso all'interno di edifici per il controllo del Topolino domestico (*Mus musculus*): posizionare 1-2 sacchettiini predosati da 20 grammi ciascuno, in un apposito contenitore per esche. Se, in base alla grandezza dell'infestazione, dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 10-15 metri l'uno dall'altro e comunque non inferiore ai 5 metri. I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 2-3 giorni all'inizio del trattamento e poi almeno settimanalmente. Ciò al fine di verificare l'integrità del contenitore, il consumo dell'esca ed eventualmente per rimuovere le carcasse dei roditori. Quando necessario reintegrare l'esca.

Uso all'interno di edifici per il controllo del Ratto grigio (*Rattus norvegicus*): posizionare 5-10 sacchettiini predosati da 20 grammi ciascuno, in un apposito contenitore per esche. Se, in base alla grandezza dell'infestazione, dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 10-15 metri l'uno dall'altro e comunque non inferiore ai 5 metri. I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 2-3 giorni all'inizio del trattamento e poi almeno settimanalmente. Ciò al fine di verificare l'integrità del contenitore, il consumo dell'esca ed eventualmente per rimuovere le carcasse dei roditori. Quando necessario reintegrare l'esca.

Uso all'esterno intorno agli edifici Per il controllo del Ratto grigio (*Rattus norvegicus*). Posizionare 5-10 sacchettiini predosati da 20 grammi ciascuno, in un apposito contenitore per esche. Se, in base alla grandezza dell'infestazione, dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 10-15 metri l'uno dall'altro e comunque non inferiore ai 5 metri. Posizionare i contenitori con le esche in aree non soggette ad allagamenti. Sostituire le esche nei contenitori se danneggiate da acqua o contaminate da sporcizia. I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni 5-7 giorni all'inizio del trattamento e almeno settimanalmente in seguito, al fine di controllare se l'esca è accettata, se i contenitori sono integri e per rimuovere i corpi dei roditori. Quando necessario reintegrare l'esca.