



Florlis®



# TOPICIDA BLOCCO PARAFFINATO SACCHETTO 300 G

Codice: 1331158

idrorepellente PRODOTTO BIOCIDA (PT14)  
AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE  
IT/2018/00449/AUT

## COMPOSIZIONE

(per 100 g): Brodifacoum 0,0025 g, Denatonium Benzoate 0,001 g, coformulanti e sostanze appetibili q.b. a g 100.

## FORMULAZIONE

Blocchetto.

## CONFEZIONI

Sacchetto da 300 g.

## Caratteristiche

È un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*) e Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in un blocco paraffinato appetibile per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non genera sospetti negli altri componenti della popolazione di roditori. Contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini. Può essere usato all'interno ed intorno degli edifici quali, ad esempio, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di proprietà.

Florlis®

[www.flortis.it](http://www.flortis.it) - [info.orvital@orvital.it](mailto:info.orvital@orvital.it)

Orvital S.p.A.

SEDE LEGALE Via Darwin, 63 - 20019 Settimo Milanese (MI)

PRODUZIONE Via San Martino, 30/32 - 20017 Rho (MI)



Florlis®

## Modalità di utilizzo

Uso all'interno di edifici per il controllo del Topolino domestico (*Mus musculus*): posizionare 2-4 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno. Se, in base alla grandezza dell'infestazione, dovessero essere necessari più contenitori posizzionarli ad una distanza di circa 10-15 metri l'uno dall'altro e comunque non inferiore ai 5 metri. I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 2-3 giorni all'inizio del trattamento e poi almeno settimanalmente per verificare l'integrità del contenitore, il consumo dell'esca ed eventualmente per rimuovere le carcasse dei roditori. Quando necessario reintegrare l'esca.

Uso all'interno di edifici ed all'esterno intorno agli edifici per il controllo del Ratto grigio (*Rattus norvegicus*): posizionare 10-20 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno. Se, in base alla grandezza dell'infestazione, dovessero essere necessari più contenitori posizzionarli ad una distanza di circa 10-15 metri l'uno dall'altro e comunque non inferiore ai 5 metri. All'esterno intorno agli edifici, posizionare i contenitori con le esche in aree non soggette ad allagamenti e sostituire le esche nei contenitori se danneggiate da acqua o contaminate da sporcizia. I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni 5-7 giorni all'inizio del trattamento e settimanalmente in seguito, al fine di controllare se l'esca è accettata, i contenitori sono integri e per rimuovere i corpi dei roditori. Riempire il contenitore quando necessario.